



# PROLAPSO RECTAL

CASO CLÍNICO 3

# PRESENTACIÓN

Paciente felino hembra de unos 2 años común europeo que llega al Albergue Insular de Gran Canaria con prolapso rectal.

Se realiza exploración rectal y se confirma la imposibilidad de resolverlo mediante la inversión del prolapso y se aprecia necrosis parcial del tejido.



## RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS RECTAL




Se procede a insertar en la luz del prolapso rectal un tubo de recogida de muestras para cultivo. Se colocan 3 suturas de posición de espesor completo hasta llegar al tubo de muestra en patron en "u" a las 12 a las 4 y a las 8 aproximadamente.

Estas suturas ayudarán a la unión de los extremos que se suturarán en simple continua.

La clave de esta cirugía será el mantener las suturas de posición e ir seccionando en círculo el área marcada a anastomosar en cuartos de circunferencia y suturando en puntos simples con monofilamento Monosyn Braun 3/0 aguja atraumática.





Completar todo el perímetro de la circunferencia con puntos de separación de unos 3 mm entre ellos y de 3mm de distancia entre la entrada de la aguja y el margen del tejido.



Soltaremos las suturas de posición y re-introducimos la porción rectal anastamosada.

El paciente se recuperó de la cirugía sin complicaciones con dieta blanda y lactulosa durante 10 días.

